

Trigger-Erfassungsschema: Leitfaden & Psychoedukation


1 Klinischer Leitfaden zur Trigger-Erfassung

Dieses Protokoll dient der differenzierten Selbstbeobachtung und klinischen Auswertung von traumaspezifischen Reaktivierungen im Alltag zwischen den Sitzungen. Die Dokumentation trennt situative Reize von internen autonomen Regulationsmustern.

- ✓ **Unterscheidung** zwischen Auslöser (Reiz), internem/externem Kontext und somatischer Antwort
- ✓ **Körperorientierte** Differenzierung autonomer Zustände: Sympathikus (Hyperarousal) vs. Dorsaler Vagus (Hypoarousal/Shutdown)
- ✓ **Einschätzung** der subjektiven Belastungsintensität auf einer Skala von 1 bis 10
- ✓ **Reflexion** und Dokumentation angewandter Regulationsstrategien und Fertigkeiten (Skills)

Sympathikus
(Hyperarousal)

Dorsaler Vagus
(Hypoarousal/Shutdown)



Klinischer Hinweis zur Psychoedukation

Autonome Reaktionen (wie Herzrasen, Muskelanspannung, Taubheitsgefühle oder Dissoziation) stellen biologische Notfallprogramme dar. Die wertfreie Beobachtung fördert die Affektregulation und stärkt die Beobachterperspektive (metakognitives Bewusstsein).

2 Handlungsanleitung für Therapie und Selbstbeobachtung

Vorgehensweise zur strukturierten Bearbeitung akuter oder retrospektiv erinnelter Belastungsmomente:

1 Situativen Reiz identifizieren



Benennen Sie den spezifischen sensorischen oder interpersonellen Auslöser (z. B. Geruch, Tonfall, plötzliches Geräusch, Gedanke, Körperhaltung).



2 Kontext erfassen



Dokumentieren Sie die Rahmenbedingungen: Wo waren Sie, mit wem, und welcher innere Vorzustand (z. B. Müdigkeit, Hunger, Reizüberflutung) lag vor?



3 Somatische Marker beobachten



Erfassen Sie körperliche Reaktionen: Sympathisch (z. B. Herzrasen, Engegefühl, Zittern, Flucht-/Kampfimpuls) oder Dorsal-vagal (z. B. Erstarren, Taubheit, Schwindel, Blickstarre, Tonusverlust)?



4 Intensität skalieren & Regulation dokumentieren



Bewerten Sie den Belastungshöhepunkt (1 = minimale Aktivierung bis 10 = maximale Überwältigung). Notieren Sie eingesetzte somatische Erdungsübungen oder Skills und deren Wirksamkeit.

3 Entscheidungsmatrix zur autonomen Zustandseinordnung

Nutzen Sie diese Kriterien zur schnellen Zuordnung der somatischen Reaktivität im Moment des Triggers:

Welche somatische Leitsymptomatik dominiert das Erleben im Moment des Triggers?



Sympathische Übererregung

(Hyperarousal: Herzklopfen, Tachykardie, flache Atmung, motorische Unruhe, Hitze)



Aktivierung dämpfen: Längere Ausatmung (z. B. 4-7-8 Rhythmus), neuromuskuläre Entspannung, sensorische Orientierung im Raum (5-4-3-2-1 Technik).



Dorsal-vagale Erstarrung

(Hypoarousal/Shutdown: Taubheit, Kälte, Dissoziation, bleierne Schwere, Tunnelblick)



Sanfte Re-Aktivierung: Kältereiz (z. B. Kaltwasser auf Handgelenke), kräftige Fußsohlenwahrnehmung, propriozeptiver Druck, aufrechte Haltung einnehmen.



Trigger-Erfassungsschema: Protokolltabelle & Dokumentation

**1**

Strukturiertes Erfassungsprotokoll: Trigger & somatische Reaktionen

Erfassungsbogen zur systematischen Eintragung von Belastungsepisoden im Alltag. Ausfüllbar im Print-Format oder digital auf dem Tablet.



Dokumentationsregel

Tragen Sie Trigger möglichst zeitnah nach Abklingen der stärksten Übererregung ein. Das Protokoll dient dem gemeinsamen Verständnis in der nächsten therapeutischen Konsultation.

1**Eintrag
1**

Datum & Uhrzeit | Spezifischer Auslöser (Reiz/Gedanke):

Interner/externer Kontext (Ort, Beteiligte, Vorbelastung):

Somatische Reaktion (Sympathikus: Kampf/Flucht vs. Dorsal Vagus: Freeze/Shutdown):

Belastungsintensität (1–10) & Angewandte Fertigkeit/Verlauf:

2**Eintrag
2**

Datum & Uhrzeit | Spezifischer Auslöser (Reiz/Gedanke):

Interner/externer Kontext (Ort, Beteiligte, Vorbelastung):

Somatische Reaktion (Sympathikus: Kampf/Flucht vs. Dorsal Vagus: Freeze/Shutdown):

Belastungsintensität (1–10) & Angewandte Fertigkeit/Verlauf:

3**Eintrag
3**

Datum & Uhrzeit | Spezifischer Auslöser (Reiz/Gedanke):

Interner/externer Kontext (Ort, Beteiligte, Vorbelastung):

Somatische Reaktion (Sympathikus: Kampf/Flucht vs. Dorsal Vagus: Freeze/Shutdown):

Belastungsintensität (1–10) & Angewandte Fertigkeit/Verlauf:

2

Therapeutische Auswertung & Musteranalyse

Abschnitt zur Reflexion wiederkehrender Muster während der therapeutischen Sitzung.

- Häufigste sensorische Triggermodalitäten (visuell, akustisch, olfaktorisch, interpersonell)
- Dominierender Reaktionspfad des autonomen Nervensystems (Sympathikus vs. Dorsal Vagus)

- Effektivität der bisher eingesetzten Erdungs- und Distanzierungsstrategien
- Zielvereinbarung für die nächste Übungsphase im Alltag



Gemeinsam erarbeitete Kernthemen & typische Warnsignale:



Priorisierte Notfall- und Erdungsstrategie für künftige Trigger: